Méthode de gestion des corps cétoniques avec la pompe

CORPS CÉTONIQUES dans le sang (mmol/L)

Lorsque ma glycémie est **supérieure à 14 mmol/L**, je bois **250 ml d'eau toutes les heures** et, **en fonction des corps cétoniques mesurés**, je dois :

Si vous êtes enceinte ou prenez l'un des médicaments suivants, **l'acidocétose peut se produire même avec une glycémie normale.**

- Canagliflozine (Invokana®)
- Dapagliflozine (Forxiga™)
- Empagliflozine (Jardiance™)
- Ertugliflozine (Steglatro™)

Il faut donc augmenter votre vigilance et mesurer vos corps cétoniques si vous avez des symptômes tels que des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales ou une haleine fruitée, et ce même si votre glycémie n'est pas élevée.

0,0 à 0,5
→ **Donner un bolus de correction** avec la pompe (calculé par la pompe)
→ **Mesurer la glycémie +/- corps cétoniques dans 4h**
→ **Evaluer la suite selon la glycémie et les corps cétoniques**

0,6 à 1,4
→ **Donner un bolus de correction** avec la pompe (calculé par la pompe)
→ **Mesurer la glycémie et les corps cétoniques dans 4h**
→ **Si les corps cétoniques ont diminué**
→ **Donner un bolus de correction** avec la pompe (calculé par la pompe)
→ **Mesurer la glycémie et les corps cétoniques dans 4h**
→ **Evaluer la suite selon la glycémie et les corps cétoniques**

→ **Si les corps cétoniques sont identiques ou augmentés**
→ **Bolus de correction** calculé par la pompe et donné par stylo ou seringue + **Changer le système de perfusion**
→ **Mesurer la glycémie et les corps cétoniques dans 4h**
→ **Si les corps cétoniques ont diminué**
→ **Donner un bolus de correction** avec la pompe (calculé par la pompe)
→ **Mesurer la glycémie et les corps cétoniques dans 4h**
→ **Evaluer la suite selon la glycémie et les corps cétoniques**

→ **Si les corps cétoniques sont identiques ou augmentés**
→ **Appeler votre équipe de soins ou vous rendre à l'urgence**

+1,5
→ **Multiplier par 1,5 le bolus de correction calculé par la pompe et le donner par stylo ou seringue** + **Changer le système de perfusion**
→ **Mesurer la glycémie et les corps cétoniques dans 4h**
→ **Si les corps cétoniques ont diminué**
→ **Donner un bolus de correction** avec la pompe (calculé par la pompe)
→ **Mesurer la glycémie et les corps cétoniques dans 4h**
→ **Evaluer la suite selon la glycémie et les corps cétoniques**

→ **Si les corps cétoniques sont identiques ou augmentés**
→ **Appeler votre équipe de soins ou vous rendre à l'urgence**

©Institut de recherches cliniques de Montréal/Université McGill
Mise à jour: 15 mars 2022