

Traitement de l'hyperglycémie (injections)

MA GLYCÉMIE EST :

Entre 7 et 10 mmol/L
avant le repas

Plus élevée que 10 mmol/L
avant le repas

Plus élevée que 14 mmol/L
4h après un bolus de
correction

OU

Plus que 18 mmol/L entre
les repas



Plus élevée que 20 mmol/L
malgré un bolus de
correction
et/ou

le **taux de corps cétoniques**
reste supérieur à **1,5 mmol/L**
avec des symptômes (p. ex.
nausées, vomissement) ou
est **supérieur à 3,0 mmol/l**



Tenter d'identifier la
cause.



Boire de l'eau
régulièrement.



Mesurer ma glycémie selon
les recommandations
habituelles.



Tenter d'identifier la
cause.



Boire de l'eau
régulièrement.



Donner un bolus de
correction avec l'insuline de
mon repas selon mon
facteur de sensibilité



Mesurer ma glycémie 4h
après le bolus de correction
et selon les
recommandations
habituelles.



Tenter d'identifier la
cause.



Boire de l'eau
régulièrement.



Mesurer les corps
cétoniques.



Donner un bolus de
correction avec l'insuline de
mon repas selon mon
facteur de sensibilité ou
évaluer la démarche
suggérée en fonction du
taux de corps cétoniques.



Mesurer ma glycémie toutes
les 4 heures.



Contactez votre équipe de
soins ou vous rendre à
l'urgence.