

## Administration du glucagon nasal

**SI LA PERSONNE N'EST PAS CAPABLE DE SE TRAITER SEULE ET PRÉSENTE LES SYMPTÔMES SUIVANTS:**

INCAPACITÉ À AVALER

SOMNOLENCE

CONFUSION

PERTE DE CONNAISSANCE

CONVULSION

**ADMINISTRER LE GLUCAGON NASAL SELON LES ÉTAPES SUIVANTES:**

1. Si la personne est inconsciente, la coucher sur le côté pour éviter qu'elle ne s'étouffe car le glucagon peut provoquer des vomissements.



2. Tirer sur la bande rouge pour retirer la pellicule plastique.



3. Ouvrir le couvercle pour sortir le dispositif.



4. Prendre le dispositif entre les doigts et placer le pouce sur le piston sans toutefois appuyer.



5. Insérer le dispositif dans une narine jusqu'à ce que les doigts touchent l'extérieur du nez.



6. Enfoncer complètement le piston avec votre pouce. Le glucagon nasal est complètement administré lorsque la ligne verte du piston disparaît.

7. Retirer et jeter le dispositif.

**APRÈS L'ADMINISTRATION:**

La personne revient généralement à elle dans les 15 minutes.

Vérifier la glycémie environ 5 minutes après l'administration et régulièrement par la suite. Dès que la personne est capable de manger, lui donner une collation contenant du sucre.

Si la personne porte une pompe à insuline et que vous savez comment l'arrêter, celle-ci devrait être arrêtée pour une durée d'une heure.

La personne devra communiquer avec son équipe de soins pour les aviser de l'incident.

**Appeler une ambulance si la personne ne revient pas à elle 15 minutes après l'administration**



Le glucagon fonctionne moins bien lorsqu'il y a eu consommation d'alcool, après une activité physique de longue durée ou chez ceux qui suivent une diète très faible en glucides.

Il faut tout de même l'administrer, mais appeler une ambulance sans attendre.

\*Le glucagon nasal peut-être administré même si la personne a un rhume.