

Trousse d'urgence scolaire pour le diabète de type 1

ACCESSOIRES DE RECHANGE

(en fonction des outils utilisés)



INJECTIONS

(stylos ou seringues)

- Aiguilles.
- Tampons d'alcool.
- Facultatif : stylo ou seringue supplémentaire avec insuline (si votre école dispose d'un frigo).



POMPE À INSULINE

- Câble de recharge ou piles (selon le type de pompe).
- Dispositifs de perfusion (cathéters avec tubulures, ou POD), ainsi que le nécessaire pour les changer (p. ex. tampons d'alcool, Skin Tac/Skin-Prep, pansements ou collants protecteurs), seulement si votre enfant est capable de gérer le remplacement. Rares sont les écoles qui ont du personnel formé pour assurer cette tâche.
- Facultatif : stylo/aiguilles ou seringue avec insuline (si votre école dispose d'un frigo), et tampons d'alcool, en cas de bris de pompe.



LECTEUR DE LA GLYCÉMIE CAPILLAIRE

(au bout du doigt)

- Piles ou fil de charge.
- Bandelettes.
- Lancettes (petites aiguilles).
- Tampons d'alcool.
- Facultatif : lecteur supplémentaire.



LECTEUR DE LA GLYCÉMIE EN CONTINU

- Collants protecteurs ou brassard (pour éviter un décollement au courant de la journée).
- Facultatif : capteur de recharge, seulement si votre enfant est capable de l'installer seul.
- Facultatif : lecteur de la glycémie capillaire supplémentaire.

AUTRES

- Contenant à déchets biomédicaux, si votre école n'en possède pas.

EN CAS D'HYP0 OU D'HYPERGLYCÉMIE



TRAITEMENT DE L'HYP0GLYCÉMIE

- Glucagon nasal (Baqsimi) ou injectable.
- Sources de sucre rapide (p.ex. Dex4, jus, miel, boissons gazeuses sucrées).
- Collations contenant des protéines - selon la disponibilité d'un frigo ou non (p.ex. barres tendres, yogourts, berlingots de lait, fromage).



TRAITEMENT DE L'HYPERGLYCÉMIE

- Facultatif : appareil de mesure des cétones avec ses bandelettes de test.