

Vaccins recommandés aux personnes vivant avec le diabète de type 1 (en plus du calendrier de vaccins de la province)

Nom du vaccin	Aide à prévenir notamment...	Âge recommandé	Rappel / doses supplémentaires
Covid-19	Les formes graves de la COVID-19, notamment la pneumonie et la détresse respiratoire	Dès 6 mois	Tous les 6 mois en l'absence de COVID-19.
Influenza (grippe)	Les complications graves, les hospitalisations et les décès liés à la grippe	Dès 6 mois	Chaque année à l'automne
Infection à pneumocoque	Les infections à pneumocoque, notamment la pneumonie et la méningite	Enfance	Une dose supplémentaire peut être recommandée à l'âge adulte (p.ex., 65 ans)
Hépatite B	L'infection du foie causée par le virus de l'hépatite B	Dès la naissance	À l'âge adulte si non reçu durant l'enfance.
Virus respiratoire syncytial (VRS)	Les formes graves d'infection à VRS	75 ans et plus	1 dose durant l'été
Tétanos	Le tétanos, une infection grave pouvant survenir lorsqu'une plaie est contaminée	Enfance et adolescence	Rappel à 50 ans.
Zona	Le zona et ses complications, notamment les douleurs nerveuses persistantes	50 ans et plus (gratuit) Autorisé dès 18 ans pour les personnes avec DT1.	2 doses, sans rappel

